

εθελοντών θα διατηρούνται στον προσωπικό τους φάκελο και θα καταγράφονται σε ειδικό ηλεκτρονικό φάκελο προκειμένου να πιστοποιηθεί η διαγνωστική και θεραπευτική αξιοπιστία της μεθόδου.

2. Διάρκεια

Η διάρκεια της φάσης εφαρμογής έχει προσδιορισθεί σε 14 μήνες.

3. Εθελοντές Ασθενείς

Κατά την περίοδο αυτή στο πρόγραμμα θα ενταχθούν 150 εθελοντές που **πληρούν τα κριτήρια αποδοχής** (όπως περιγράφηκαν παραπάνω) και δεν εμπίπτουν στα κριτήρια αποκλεισμού, οι οποίοι θα κατανεμηθούν τυχαία στις ομάδες πραγματικής έκθεσης (50 ασθενείς σε κάθε ομάδα) και τις ομάδες εικονικής έκθεσης (25 ασθενείς στην κάθε ομάδα) και κατατάσσονται στις παρακάτω δύο ομάδες.

A. Κατά Πλάκας Σκλήρυνση . 50 (πενήντα) εθελοντές.

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται εθελοντές με Κατά Πλάκας Σκλήρυνση, με μόνιμες ή προοίοντως επιβαρυνόμενες βλάβες, ανθεκτικοί στις σύγχρονες θεραπείες. Οι ασθενείς δεν διακόπτουν τις αγωγές που ακολουθούν στο σπίτι τους κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος.

A1: Κατά Πλάκας Σκλήρυνση . Ομάδα εικονικής έκθεσης(Placebo): 25 (είκοσι πέντε) εθελοντές

Εντάσσονται εθελοντές όπως παραπάνω και ακολουθούν την ίδια διαδικασία έκθεσης στα πεδία, με τα με τις συσκευές «αναμένες» (on), χωρίς όμως εκπομπή(off) των αντίστοιχων πεδίων

B. Χρόνιες Κακοήθειες Παθήσεις. 50(πενήντα) εθελοντές.

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται εθελοντές με κακοήθειες νόσους κατά προτεραιότητα τελικού σταδίου που έχουν ολοκληρώσει τις κλασσικές θεραπείες και βρίσκονται υπό συντηρητική ή συμπτωματική αγωγή(π.χ. αναλγητικά, αιμοποιητικά σκευάσματα κ. λ.), την οποία διατηρούν κατά την διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

B1. Χρόνιες Κακοήθειες Παθήσεις. Ομάδα εικονικής έκθεσης(Placebo): 25 (είκοσι πέντε) εθελοντές

Εντάσσονται εθελοντές όπως παραπάνω και ακολουθούν την ίδια διαδικασία έκθεσης στα πεδία, με τα με τις συσκευές «αναμένες» (on), χωρίς όμως εκπομπή(off) των αντίστοιχων πεδίων

Στην ομάδα αυτή η εικονική έκθεση γίνεται μόνο για τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες (ώρα Μεθοδολογία). Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής εικονικής έκθεσης, οι εθελοντές υποβάλλονται σε πλήρη κλινικοεργαστηριακό έλεγχο και σε όσους διαπιστωθεί εξέλιξη της πάθησης, μεταφέρονται στην ομάδα πραγματικής έκθεσης.